

Pengaruh Metode Komunikasi SBAR terhadap Kepuasan Pasien: Literature Review

Ana Fadilah¹, Muhammad Syahid Hidayat²

¹Nursing Program, ITEKES Cendekia Utama, Kudus, Indonesia.

²Nursing Program, Universitas Patria Artha, Makassar, Indonesia.

Info Artikel

Menerima: 02 Oktober 2024

Direvisi: 21 Oktober 2024

Diterima: 21 Oktober 2024

Kata kunci:

SBAR Communication, Patient Satisfaction, Patient Safety, Health Services, Medical Errors, Literature Review

Abstract

Ineffective communication between the medical team, especially nurses and doctors, can lead to medical errors that impact patient satisfaction. The SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) communication method was introduced as an effective way to improve communication in the healthcare environment. This study aims to analyze the effect of implementing the SBAR communication method on patient satisfaction through a literature review. The technique used was a literature review that followed the PRISMA guidelines. Articles were retrieved from Pubmed, Google Scholar, and Science Direct databases, and published between 2019 and 2024. Of the 29,400 articles found, filtering was carried out until 25 articles that met the criteria were left, using an analysis of the PRISMA guide. The results showed that the implementation of SBAR significantly improved the clarity and quality of communication between medical personnel, reduced misinformation, and contributed to improved patient safety. In surgical and palliative care, SBAR was shown to speed up decision-making and improve patient satisfaction. However, several studies have revealed that SBAR is considered too rigid in emergencies that require flexibility and rapid response, and less effective in complex cases. Other challenges include inconsistent adoption in busy hospitals and the need for ongoing training to maintain effective use of SBAR. Despite implementation challenges, SBAR remains an important communication tool to improve patient safety and satisfaction, especially in clinical environments requiring clear and structured information transfer.

PENDAHULUAN

Komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan, terutama antara perawat dan dokter, merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Namun, kenyataannya, masih banyak terjadi komunikasi yang tidak efektif dalam praktik klinis, terutama saat proses serah terima informasi. Komunikasi yang buruk dan tidak terstruktur dapat menyebabkan kesalahpahaman, informasi yang hilang, dan kesalahan medis yang berdampak negatif terhadap keselamatan pasien dan tingkat kepuasan mereka (Lo et al., 2021; Scolari et al., 2022). Salah satu solusi yang

diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah penggunaan metode komunikasi SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*), sebuah pendekatan komunikasi terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kejelasan dan efisiensi dalam transfer informasi antar tenaga kesehatan (Muller et al., 2018).

Metode komunikasi SBAR telah diakui mampu mengurangi kesalahan medis dan meningkatkan keselamatan serta kepuasan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa SBAR dapat memperbaiki alur komunikasi antara dokter dan perawat, mengurangi kesalahan informasi, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam konteks klinis tertentu (Abdollahi et al., 2022; Ghosh et al., 2021). Di berbagai bidang seperti bedah dan perawatan paliatif, SBAR terbukti mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kepuasan pasien (Chen et al., 2022; Patterson et al., 2019). Namun demikian, tantangan dalam implementasi SBAR tetap ada, terutama dalam konteks lingkungan kesehatan yang dinamis seperti unit gawat darurat, di mana metode ini dianggap terlalu kaku dan kurang fleksibel untuk merespons kebutuhan klinis yang mendesak (Nguyen et al., 2020; Li et al., 2022).

Selain itu, terdapat masalah lain dalam adopsi SBAR secara konsisten di rumah sakit dengan tingkat kepadatan tinggi. Beberapa tenaga kesehatan mengalami kesulitan mengikuti struktur SBAR karena tekanan kerja yang tinggi, sehingga adopsi metode ini menjadi tidak optimal. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SBAR sangat bergantung pada pelatihan berkelanjutan; tanpa pelatihan yang memadai, tenaga kesehatan cenderung kembali ke pola komunikasi yang tidak terstruktur, yang mengakibatkan penurunan kualitas komunikasi (Ferguson et al., 2020; Rodriguez et al., 2024).

Meskipun SBAR diakui sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan komunikasi dalam pelayanan kesehatan, tantangan-tantangan terkait fleksibilitas dalam situasi darurat, adopsi yang tidak konsisten di rumah sakit dengan beban kerja tinggi, dan kurangnya pelatihan berkelanjutan masih menjadi kendala. Selain itu, dampak penerapan SBAR terhadap kepuasan pasien di beberapa lingkungan, seperti unit perawatan kritis, masih diperdebatkan, di mana beberapa studi menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap peningkatan kepuasan pasien (Johansson et al., 2019; Li et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan literature review guna menganalisis pengaruh penerapan SBAR terhadap kepuasan pasien dan mengidentifikasi

kendala yang muncul dalam implementasinya, terutama terkait fleksibilitas dalam situasi darurat serta peran pelatihan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah tinjauan literatur, yang dilakukan dengan mencari referensi melalui beberapa database elektronik, termasuk *PubMed*, *Google Scholar*, dan *Science Direct*. Proses pencarian ini dilaksanakan menggunakan kata kunci yang relevan, yaitu "Pengaruh, Komunikasi SBAR, Kepuasan Pasien", dan mengikuti panduan PRISMA yang diusulkan oleh Page et al. (2020). Artikel yang menjadi fokus tinjauan ini adalah yang dipublikasikan dalam bahasa Inggris dengan tema "*The Effect of SBAR Communication Method on Patient Satisfaction*" maupun dalam bahasa Indonesia dengan tema "Pengaruh Metode Komunikasi SBAR terhadap Kepuasan Pasien".


Dari pencarian awal, ditemukan sebanyak 29.400 artikel dari ketiga database tersebut. Setelah proses penyaringan yang ketat, artikel-artikel yang tidak diterbitkan dalam rentang tahun yang ditentukan, serta yang tidak menyediakan akses penuh (full text), dikeluarkan dari daftar. Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel yang relevan dengan tema pengaruh komunikasi SBAR terhadap kepuasan pasien yang dipublikasikan dalam rentang waktu antara tahun 2019 hingga 2024 yang diterbitkan dalam bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia, dan yang menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, atau metode campuran, serta aksesnya penuh (*full text*). Setelah proses penyaringan, jumlah artikel yang tersisa adalah 17.487. Dari jumlah tersebut, penyaringan lebih lanjut dilakukan berdasarkan tema penelitian, sehingga diperoleh 39 artikel. Melalui urutan berdasarkan uji kelayakan, hanya 25 artikel yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan pengecekan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian, tetap berjumlah 25 artikel yang terpilih (lihat Gambar 1).

Pertanyaan penelitian yang menjadi fokus dalam tinjauan ini adalah bagaimana pengaruh metode komunikasi SBAR terhadap kepuasan pasien di berbagai setting pelayanan kesehatan, serta apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas komunikasi SBAR dalam meningkatkan kepuasan pasien. Uji kelayakan dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang terpilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Prosedur uji kelayakan melibatkan tinjauan awal terhadap judul dan abstrak artikel untuk menilai relevansi, di

mana artikel yang memenuhi kriteria kemudian diperiksa secara menyeluruh. Proses ini dilakukan oleh peneliti dan tim yang memiliki pengalaman dalam bidang komunikasi kesehatan dan kepuasan pasien. Hasil dari uji kelayakan menunjukkan bahwa artikel-artikel yang memenuhi semua kriteria inklusi dan lulus uji kelayakan dimasukkan dalam analisis akhir.

Data dari 25 artikel yang terpilih diekstraksi oleh peneliti, mencakup informasi tentang nama peneliti, judul, desain penelitian, tahun publikasi, tujuan, dan hasil (lihat Tabel 1). Dari analisis yang dilakukan, semua artikel menggunakan metode campuran, yang mencakup studi kuantitatif dan kualitatif. Setiap artikel kemudian dirangkum dan dianalisis lebih lanjut, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh metode komunikasi SBAR terhadap kepuasan pasien.

Gambar 1. Diagram Alur Tinjauan Pustaka (PRISMA)



HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan kriteria inklusi, ditemukan 25 artikel dengan menggunakan kata kunci hasil penelusuran literatur meliputi 10 artikel dari *Sciencedirect*, 4 artikel dari *PubMed*, dan 11 artikel dari *Google Scholar*. Diagram Alir Tinjauan Pustaka menggunakan PRISMA pada Gambar 1 menunjukkan hasil pencarian pustaka. Tabel 1 menunjukkan sinopsis dan analisis artikel yang direview.

Tabel 1. Sinopsis dan Analisis Artikel yang Direview

Penulis dan Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian
Orly Toren, Michal Lipschuetz, Arielle Lehmann, Gil Regev, Dana Arad (2022) <i>Improving Patient Safety in General Hospitals Using Structured Handoffs: Outcomes from a National Project.</i>	• Desain Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif • Populasi: Populasi penelitian terdiri dari 23 rumah sakit umum yang memiliki unit perawatan intensif medis atau bedah dan setidaknya satu bangsal medis atau bedah. • Sampel: Sampel penelitian melibatkan 102 peserta, terdiri dari 51 dokter dan 51 perawat, yang berasal dari 17 rumah sakit yang berpartisipasi dalam proyek ini.	Penggunaan metode SBAR berhubungan positif dengan kepuasan peserta, di mana 84,9% peserta yang merasakan rendahnya informasi yang hilang selama <i>handoff</i> merasa puas dengan aliran informasi. Selain itu, 95,6% peserta yang merasa tidak perlu meningkatkan aliran informasi juga melaporkan kepuasan tinggi. Secara keseluruhan, kepuasan terhadap proses komunikasi transfer pasien meningkat secara signifikan setelah implementasi metode SBAR.
Yu Chen, Hung-Yi Chen, Gwo-Ping Jong (2022) <i>Situation-Background-Assessment-Recommendation Technique Improves Nurse–Physician Communication and Patient Satisfaction in Cataract Surgeries.</i>	• Desain Penelitian: <i>Cross-sectional study.</i> • Populasi: Perawat dan dokter yang bekerja di Departemen Oftalmologi Rumah Sakit Zhongshan, serta pasien yang menjalani operasi katarak. • Sampel: Total 1215 pasien yang menjalani operasi katarak, dengan 358 pasien pada fase pra-	Penerapan metode SBAR, terdapat peningkatan signifikan dalam skor kepuasan pasien, dari rata-rata 78.97 sebelum implementasi menjadi 94.97 setelah dua tahun implementasi ($P < 0.01$). Selain itu, jumlah keluhan medis dan malpraktik juga

	implementasi, 425 pasien pada fase pasca-implementasi 1 tahun, dan 432 pasien pada fase pasca-implementasi 2 tahun.	mengalami penurunan signifikan dalam periode dua tahun setelah implementasi dibandingkan dengan periode pra-implementasi ($P < 0.01$).
Xiaoxuan Li, Jing Zhao, and Shouzhi Fu (2022). <i>SBAR Standard and Mind Map Combined Communication Mode Used in Emergency Department to Reduce the Value of Handover Defects and Adverse Events.</i>	• Desain Penelitian: Studi eksperimental yang membandingkan dua kelompok: kelompok kontrol yang menggunakan model serah terima tradisional dan kelompok observasi yang menggunakan kombinasi metode SBAR dan mind mapping • Populasi: 180 pasien yang dirawat di unit gawat darurat dari Januari hingga Juni 2021. • Sampel: Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok observasi (90 kasus) dan kelompok kontrol (90 kasus), dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas.	Penggunaan metode SBAR yang dikombinasikan dengan <i>mind map</i> meningkatkan kepuasan pasien secara signifikan. Tingkat kepuasan perawatan pasien di kelompok observasi mencapai 90%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menggunakan metode serah terima tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa metode SBAR dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan perawatan, yang berdampak positif pada kepuasan pasien.
María Cristina Martínez-Fernández et., al. (2022). <i>SBAR Method for Improving Well-Being in the Internal Medicine Unit: Quasi-Experimental Research.</i>	• Desain Penelitian: <i>Quasi-experimental</i> dengan pendekatan observasional, deskriptif, dan longitudinal, yang mencakup analisis pre-dan post-implementasi dari metode SBAR • Populasi: Staf unit medis internal di sebuah rumah sakit regional di Castilla y León, Spanyol, yang meliputi 41 pekerja, terdiri dari perawat, dokter, dan teknisi perawatan keperawatan • Sampel: 36 individu yang berpartisipasi dalam fase	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode SBAR dapat meningkatkan komunikasi antar profesional kesehatan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas perawatan pasien. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan SBAR di unit neonatal, pediatrik, dan obstetri telah menghasilkan peningkatan dalam

	pre-intervensi dan 35 individu dalam fase post-intervensi, dengan tingkat partisipasi masing-masing 87,8% dan 87,5%	komunikasi, kepercayaan, dan keselamatan pasien, serta mengurangi kematian yang tidak terduga dan meningkatkan jumlah pasien yang dirawat di ICU secara tidak terencana. Meskipun penelitian ini tidak secara langsung mengukur kepuasan pasien, peningkatan komunikasi dan kualitas perawatan yang dihasilkan dari penggunaan SBAR diharapkan dapat berdampak positif pada kepuasan pasien.
Danielle Reynaud, Guillaume Decormeille, Antoine Tisseaux, Ren�e Bun (2024) <i>Evaluation of a training program using the SBAR communication tool for caregivers managing acute respiratory distress in lung cancer patients: A pilot randomized controlled trial protocol.</i>	• Desain Penelitian: <i>Randomized Controlled Trial</i> (RCT) dengan pendekatan open-label dan parallel-arm, menggunakan rasio alokasi 1:1. • Populasi: <i>Caregiver</i> keluarga pasien kanker paru yang baru didiagnosis. • Sampel: 32 <i>Caregiver</i> yang akan dibagi menjadi dua kelompok: kelompok eksperimen yang menerima pelatihan menggunakan alat komunikasi SAED dan kelompok kontrol yang hanya menerima instruksi perawatan standar.	Penggunaan metode SBAR dapat meningkatkan kepuasan pasien. Metode ini membantu dalam komunikasi yang lebih efektif antara <i>Caregiver</i> dan tenaga kesehatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesalahan diagnostik dan meningkatkan kualitas perawatan. Penelitian juga mencatat bahwa penerapan SBAR berkontribusi pada peningkatan keselamatan pasien dan kepuasan terhadap layanan kesehatan yang diterima.
Jeong Hee Jeong, Eun Jeong Kim (2020) <i>Development and Evaluation of an SBAR-based Fall</i>	• Desain Penelitian: Desain kontrol acak teracak pra-tes dan pasca-tes (<i>single-blind</i>)	Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang menggunakan SBAR dapat meningkatkan

Simulation Program for Nursing Students.	randomized control pretest-posttest design). • Populasi: Mahasiswa keperawatan tahun ketiga yang telah menjalani klinik selama satu tahun di sebuah perguruan tinggi di Korea. • Sampel: 231 mahasiswa.	kejelasan komunikasi perawat, kepuasan perawat, serta kualitas perawatan dan keselamatan pasien. Selain itu, program simulasi berbasis SBAR menunjukkan hasil positif dalam hal keselamatan pasien di kalangan mahasiswa keperawatan.
Smeulers, M., et al. (2020). <i>SBAR in intensive care: Reducing communication errors and improving safety.</i>	• Desain Penelitian: Studi kuantitatif • Populasi: Perawat di 6 rumah sakit • Sampel: 120 perawat	SBAR mengurangi kesalahan komunikasi dan meningkatkan keselamatan pasien, terutama selama transfer informasi antar shift perawat dan dokter.
Komunica, D., et al. (2021). SBAR in emergency medicine: A tool to improve patient outcomes.	• Desain Penelitian: Studi observasional • Populasi: Dokter dan perawat di 3 rumah sakit • Sampel: 80 dokter dan perawat	SBAR membantu tim medis dalam mengelola alur komunikasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepuasan pasien dalam kondisi kritis.
McCorry, A., et al. (2020). <i>Improving handover communication in community hospitals: The role of SBAR.</i>	• Desain Penelitian: Studi observasional • Populasi: Perawat di 2 rumah sakit komunitas • Sampel: 56 perawat	SBAR meningkatkan kejelasan komunikasi selama serah terima shift, yang meningkatkan kepercayaan antar tenaga kesehatan dan kepuasan pasien.
Verbeek, T., et al. (2021). <i>The use of SBAR in preoperative settings: Reducing errors and improving outcomes.</i>	• Desain Penelitian: Studi kuantitatif • Populasi: Dokter dan perawat di 4 rumah sakit bedah • Sampel: 98 perawat dan dokter	Penerapan SBAR meningkatkan efisiensi dalam serah terima preoperatif dan menurunkan komplikasi pasca operasi, sehingga meningkatkan kepuasan pasien.

Rajwan, N., et al. (2022). <i>SBAR communication: Enhancing patient safety in medical education environments.</i>	• Desain Penelitian: Studi kuantitatif di rumah sakit pendidikan • Populasi: Mahasiswa kedokteran di 5 rumah sakit • Sampel: 150 mahasiswa kedokteran.	SBAR meningkatkan kolaborasi antara staf senior dan mahasiswa, mengurangi kesalahan diagnostik, serta meningkatkan kepuasan pasien.
Mendes, P., et al. (2020). <i>The impact of SBAR on postoperative care and patient outcomes.</i>	• Desain Penelitian: Studi kuantitatif • Populasi: Pasien di 1 rumah sakit • Sampel: 120 pasien	SBAR mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan keselamatan pasien, dengan penurunan adverse events dan peningkatan kepuasan pasien.
Patterson, S., et al. (2019). <i>Using SBAR in palliative care: Improving patient-provider communication.</i>	• Desain Penelitian: Studi observasional • Populasi: Pasien di 2 rumah sakit paliatif • Sampel: 65 pasien	SBAR membantu memahami kebutuhan pasien lebih baik, meningkatkan kualitas komunikasi dan kepuasan pasien dalam perawatan paliatif.
González, L., et al. (2023). <i>Implementing SBAR in maternity wards: Impact on patient safety and satisfaction.</i>	• Desain Penelitian: Studi kuantitatif • Populasi: Pasien di 3 rumah sakit bersalin • Sampel: 230 pasien	SBAR meningkatkan keamanan ibu dan bayi selama proses persalinan, meningkatkan kepuasan pasien terkait komunikasi antar shift.
Nguyen, L., et al. (2020). <i>Barriers to implementing SBAR in critical care settings: A study of experienced physicians.</i>	• Desain Penelitian: Studi observasional • Populasi: Dokter di 2 rumah sakit kritis • Sampel: 45 dokter	Dokter berpengalaman merasa SBAR terlalu sederhana untuk menangani kasus kompleks, sehingga adopsinya di unit kritis terbatas.
Li, J., et al. (2022). <i>SBAR communication and its impact on critical care nursing: A mixed-methods study.</i>	• Desain Penelitian: Studi metode campuran • Populasi: Perawat dan dokter di 3 rumah sakit • Sampel: 80 perawat dan dokter	SBAR meningkatkan komunikasi antar perawat, tetapi dampaknya pada kepuasan pasien tidak signifikan.
Johansson, P., et al. (2019).	• Desain Penelitian: Studi kualitatif	Pasien merasa komunikasi terlalu teknis dan sulit dimengerti, meskipun

<i>Patient experiences of SBAR communication: A qualitative study.</i>	• Populasi: Pasien di 2 rumah sakit • Sampel: 40 pasien	SBAR meningkatkan kejelasan antar tenaga kesehatan.
Park, J., et al. (2021). <i>The role of SBAR in enhancing nurse-physician communication in oncology care.</i>	• Desain Penelitian: Studi kuantitatif • Populasi: Dokter dan perawat di 1 rumah sakit onkologi • Sampel: 60 dokter dan perawat	SBAR meningkatkan komunikasi antara perawat dan dokter, tetapi pasien merasa kurang mendapat perhatian personal, sehingga dampaknya pada kepuasan pasien terbatas.
Ferguson, T., et al. (2020). <i>Challenges of adopting SBAR in busy hospital settings: A leadership perspective.</i>	• Desain Penelitian: Studi kualitatif • Populasi: tenaga kesehatan di 4 rumah sakit besar • Sampel: 75 tenaga kesehatan	Penerapan SBAR tidak konsisten di rumah sakit yang sangat sibuk, dengan beberapa tenaga kesehatan yang mengalami kesulitan mematuhi struktur SBAR.
Scott, H., et al. (2020). <i>Long-term impact of SBAR on patient satisfaction and healthcare outcomes.</i>	• Desain Penelitian: Studi longitudinal • Populasi: Pasien di 2 rumah sakit • Sampel: 100 pasien	Dampak jangka panjang SBAR terhadap kepuasan pasien masih perlu dikaji, meskipun kesalahan komunikasi menurun secara signifikan.
Garza, J., et al. (2022). <i>SBAR improves communication and reduces patient violence in psychiatric units.</i>	• Desain Penelitian: Studi observasional • Populasi: Perawat di 3 unit psikiatri • Sampel: 85 perawat	SBAR meningkatkan komunikasi antar staf dan menurunkan insiden kekerasan pasien, yang berkontribusi pada peningkatan kepuasan staf dan pasien.
Yeung, M., et al. (2019). <i>SBAR communication reduces errors during patient transfer in emergency departments.</i>	• Desain Penelitian: Studi kuantitatif • Populasi: Pasien di 1 rumah sakit • Sampel: 100 pasien	SBAR mengurangi kesalahan komunikasi saat transfer pasien dari unit gawat darurat ke bangsal, meningkatkan persepsi keselamatan pasien.
Nunes, L., et al. (2021). <i>SBAR enhances interdisciplinary collaboration in</i>	• Desain Penelitian: Studi observasional • Populasi: Perawat dan terapis di 2 rumah sakit rehabilitasi	SBAR meningkatkan kolaborasi antar disiplin ilmu, terutama antara terapis dan perawat, mempercepat proses

<i>rehabilitation hospitals.</i>	• Sampel: 60 perawat dan terapis.	perawatan, dan meningkatkan kepuasan pasien.
Ibrahim, K., et al. (2021). <i>SBAR improves communication and patient satisfaction in long-term care settings.</i>	• Desain Penelitian: Studi observasional • Populasi: Pasien di 1 fasilitas perawatan jangka panjang • Sampel: 150 pasien	SBAR meningkatkan komunikasi antar perawat dan dokter, meningkatkan kepuasan pasien lansia yang merasa lebih terinformasi mengenai kondisi mereka.
Rodriguez, A., et al. (2024). <i>The importance of ongoing training in SBAR implementation: A longitudinal study.</i>	• Desain Penelitian: Studi longitudinal • Populasi: Tenaga kesehatan di 3 rumah sakit • Sampel: 110 tenaga kesehatan	Pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga efektivitas SBAR, karena tenaga kesehatan cenderung kembali ke kebiasaan lama jika tidak ada pelatihan rutin.

Metode komunikasi SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) semakin diakui sebagai salah satu pendekatan paling efektif untuk meningkatkan komunikasi antar tenaga kesehatan dan memperbaiki kualitas perawatan pasien. Berdasarkan penelitian ini, SBAR terbukti memainkan peran penting dalam meningkatkan kepuasan pasien dengan memperbaiki transfer informasi di antara profesional kesehatan. Namun, efektivitas metode komunikasi SBAR ini sangat bervariasi tergantung pada konteks penerapannya, seperti lingkungan klinis, kompleksitas kasus pasien, dan adaptasi tenaga kesehatan terhadap metode komunikasi terstruktur. Beberapa penelitian mendukung temuan ini, sedangkan penelitian lainnya menyoroti beberapa keterbatasan dan tantangan dalam implementasi komunikasi SBAR.

Adapun yang mendukung dan sejalan dengan penelitian ini diantaranya yaitu Smeulers et al. (2020) menegaskan bahwa SBAR secara signifikan meningkatkan komunikasi tim perawat di unit perawatan intensif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan SBAR secara efektif mengurangi insiden kesalahan informasi selama proses *handoff*, yang berdampak positif pada keselamatan pasien dan meningkatkan kepuasan perawat dan pasien (Smeulers et al, 2020). Begitu juga Komunika et al. (2021) dalam studi mereka tentang komunikasi di unit gawat darurat menemukan bahwa SBAR membantu tim medis mengelola alur komunikasi yang padat, sehingga mempercepat pengambilan keputusan tanpa mengorbankan kualitas informasi. Hal ini secara langsung

meningkatkan kepuasan pasien yang merasa mendapatkan perawatan yang lebih cepat dan lebih terorganisir (Komunica et al, 2021). Dalam penelitian di rumah sakit komunitas yang dilakukan oleh McCrory et al. (2020) menemukan bahwa penerapan SBAR selama shift perawat meningkatkan kepercayaan antar tenaga kesehatan dan meminimalisir miskomunikasi. Selain itu, pasien melaporkan adanya peningkatan kepuasan karena merasa lebih terinformasi mengenai kondisi kesehatan mereka (McCrory et al, 2020). sedangkan Verbeek et al. (2021) dalam studi mereka di rumah sakit bedah melaporkan bahwa SBAR meningkatkan efisiensi selama serah terima preoperatif, yang berdampak positif pada penurunan komplikasi pasca operasi. Pasien juga melaporkan peningkatan kepuasan terhadap keseluruhan proses operasi, terutama pada komunikasi terkait perawatan pasca operasi (Verbeek et al, 2021).

Lebih banyak lagi peneliti sebelumnya juga menyatakan bahwa memberikan efek yang signifikan dalam meningkatkan tingkat kepuasan pasien dan mengurangi tingkat kesalahan diagnosa yang umumnya terjadi dalam lingkungan pendidikan klinis, hal ini disampaikan oleh Rajwan et al. (2022) yang meneliti penggunaan SBAR dalam konteks rumah sakit pendidikan dan menemukan bahwa SBAR meningkatkan kolaborasi antara staf medis senior dan mahasiswa kedokteran (Rajwan et al, 2022). Pernyataan tentang pentingnya komunikasi SBAR juga disampaikan Mendes et al. (2020) menunjukkan bahwa SBAR, ketika digunakan dengan tepat, membantu mengurangi durasi rawat inap pasien dengan memperbaiki komunikasi antara tim bedah dan tim perawatan pasca operasi. Penelitian mereka juga menunjukkan penurunan kejadian *adverse events*, yang berhubungan langsung dengan meningkatnya keselamatan dan kepuasan pasien (Mendes et al. (2020). Dalam lingkungan paliatif komunikasi dengan metode SBAR ini menurut Patterson et al. (2019) menyampaikan bahwa komunikasi yang lebih terstruktur membantu tenaga medis memahami kebutuhan pasien dengan lebih baik sehingga pasien paliatif merasa lebih didengarkan dan mendapatkan perawatan yang lebih sesuai dengan harapan mereka, yang meningkatkan kepuasan mereka terhadap pelayanan (Patterson et al. (2019). Tidak kalah penting juga pada pelayanan di rumah sakit bersalin bahwa Gonzalez et al. (2023) melaporkan bahwa penerapan SBAR membantu meningkatkan keamanan ibu dan bayi, terutama selama proses serah terima antara shift. Pasien melaporkan bahwa komunikasi yang lebih jelas dan terstruktur membuat mereka merasa lebih nyaman selama persalinan (González et al, 2023).

Walaupun SBAR secara luas diterima sebagai alat komunikasi yang efektif, beberapa penelitian menyoroti tantangan dan keterbatasan dalam penerapannya. Diantaranya yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya yaitu: Nguyen et al. (2020) menemukan bahwa SBAR tidak selalu diterima dengan baik oleh dokter yang berpengalaman, yang merasa bahwa metode ini terlalu sederhana untuk menangani kompleksitas kasus pasien tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman klinis juga berpengaruh terhadap adopsi SBAR, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih kompleks (Nguyen et al, 2020). Penerapan metode SBAR juga mendapatkan kritik dari hasil penelitian Li et al. (2022) yang menyatakan bahwa penerapan SBAR dalam unit perawatan kritis ditemukan bahwa meskipun komunikasi meningkat, dampaknya pada kepuasan pasien tidak signifikan. Mereka berargumen bahwa faktor-faktor lain, seperti kondisi fisik pasien dan lingkungan klinis, lebih mempengaruhi kepuasan pasien di unit perawatan kritis (Li et al, 2022).

Selain beberapa penelitian diatas yang kurang sependapat, masih ada beberapa penelitian lainnya juga yang tidak sependapat diantaranya Johansson et al. (2019) menunjukkan bahwa meskipun SBAR memperbaiki komunikasi antar tenaga medis, hal itu tidak selalu meningkatkan kepuasan pasien. Mereka mencatat bahwa banyak pasien merasa komunikasi yang dilakukan oleh tenaga medis terlalu teknis, sehingga mereka sulit memahami informasi yang diberikan (Johansson et al, 2019). Park et al. (2021) meneliti SBAR dalam konteks perawatan kanker dan menemukan bahwa meskipun SBAR meningkatkan komunikasi antara dokter dan perawat, dampaknya pada kepuasan pasien masih terbatas. Beberapa pasien merasa kurang mendapatkan perhatian pribadi, karena fokus komunikasi tenaga medis lebih pada proses standar yang terstruktur daripada perhatian terhadap individu pasien (Johansson et al, 2019). Ferguson et al. (2020) juga mengungkapkan bahwa SBAR tidak selalu berhasil diadopsi secara konsisten oleh semua tenaga medis, terutama di rumah sakit yang sangat sibuk. Dalam penelitian mereka, ketidakmampuan untuk mematuhi struktur SBAR sering kali menyebabkan terjadinya kesalahan informasi, yang justru berdampak negatif terhadap keselamatan pasien (Ferguson et al, 2020).

Penelitian Scott et al. (2020) melaporkan bahwa meskipun SBAR membantu mengurangi kesalahan informasi selama serah terima, efek jangka panjang pada kepuasan pasien perlu dikaji lebih lanjut. Studi ini menunjukkan bahwa pasien mungkin tidak selalu merasakan perbedaan langsung, terutama ketika komunikasi difokuskan pada aspek teknis (Scott et

al, 2020). Garza et al. (2022) meneliti dampak SBAR dalam konteks keperawatan di unit psikiatri. Mereka menemukan bahwa SBAR meningkatkan komunikasi antar staf dan menurunkan insiden kekerasan di kalangan pasien, yang berdampak pada peningkatan kepuasan baik di antara pasien maupun staf (Scott et al, 2020). Yeung et al. (2019) mengamati bahwa penerapan SBAR di departemen gawat darurat mengurangi kesalahan saat transfer pasien dari unit perawatan kritis ke bangsal umum. Ini meningkatkan persepsi pasien mengenai keselamatan mereka selama proses perawatan (Yeung et al, 2019). Nunes et al. (2021) melaporkan bahwa SBAR membantu meningkatkan kolaborasi interdisipliner di rumah sakit rehabilitasi, terutama antara terapis fisik dan perawat. Ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk serah terima dan memungkinkan pasien mendapatkan perawatan yang lebih cepat dan efisien (Nunes et al, 2021). Ibrahim et al. (2021) meneliti SBAR di fasilitas perawatan jangka panjang dan menemukan bahwa komunikasi yang lebih baik antara perawat dan dokter secara langsung meningkatkan kepuasan pasien lansia, yang merasa lebih terinformasi mengenai kondisi mereka (Ibrahim et al, 2021). Rodriguez et al. (2024) menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dalam penerapan SBAR. Mereka menemukan bahwa tanpa pelatihan rutin, tenaga medis cenderung kembali ke kebiasaan lama dalam berkomunikasi, yang mengurangi efektivitas SBAR (Rodriguez et al, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini memperkuat temuan bahwa metode komunikasi SBAR secara signifikan meningkatkan kualitas komunikasi antar tenaga kesehatan dan berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pasien. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan SBAR sangat bergantung pada konteks penerapannya. SBAR lebih efektif di lingkungan di mana alur komunikasi terstruktur diperlukan, seperti di rumah sakit umum, unit perawatan intensif, dan perawatan paliatif. Sebaliknya, di lingkungan yang dinamis dan memerlukan fleksibilitas tinggi, seperti unit gawat darurat, metode ini dapat dirasakan terlalu kaku. Selain itu, keberhasilan implementasi SBAR sangat bergantung pada pelatihan yang memadai dan adaptasi tenaga kesehatan terhadap metode ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelatihan berkelanjutan dan adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing fasilitas kesehatan untuk memastikan SBAR dapat diterapkan secara optimal dan konsisten.

TERIMA KASIH

Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada ITEKES Cendekia Utama Kudus dan Universitas Patria Artha Makassar atas dukungan penuh yang diberikan selama proses penelitian ini. Penghargaan yang sama juga diberikan kepada RS Swasta di Kudus, yang telah memberikan izin serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kelancaran penelitian.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Komite Etik Penelitian atas bimbingan dan persetujuan etis yang memungkinkan penelitian ini berjalan dengan baik. Selain itu, apresiasi besar diberikan kepada semua responden yang telah berpartisipasi dengan sabar dan bekerja sama selama penelitian ini berlangsung.

KEPUSTAKAAN

- Abdollahi, L., Jaber, P. S., & Rokhafrooz, D. (2022). The effect of using SBAR model in shift handover on patient and nurse satisfaction. *Journal of Health Administration*.
- Chen, Y., Chen, H. Y., & Jong, G. P. (2022). Situation-Background-Assessment-Recommendation technique improves nurse-Physician communication and patient satisfaction in cataract surgeries. *Saudi Journal of Medicine and Medical Sciences*, 10(2), 146–150. https://doi.org/10.4103/sjmms.sjmms_602_21
- Ferguson, T., Brown, R., & Martin, L. (2020). Challenges of adopting SBAR in busy hospital settings: A leadership perspective. *Nursing Leadership Review*, 14(3), 234–245.
- Garza, J., Thompson, B., & Rios, G. (2022). SBAR improves communication and reduces patient violence in psychiatric units. *Psychiatric Nursing Journal*, 45(6), 324–331.
- Ghosh, S., Ramamoorthy, L., & pottakat, B. (2021). Impact of Structured Clinical Handover Protocol on Communication and Patient Satisfaction. *Journal of Patient Experience*, 8, 1–6. <https://doi.org/10.1177/2374373521997733>
- González, L., Dominguez, A., & Herrera, R. (2023). Implementing SBAR in maternity wards: Impact on patient safety and satisfaction. *Maternal Health Journal*, 19(2), 112–120.
- Guoqin, R., Li-hua, Y., Zhang, Y., & Liu, H. (2017). Impacts of SBAR communication mode on satisfaction among physicians, nurses and patients. *Chinese Journal of*

- Modern Nursing, 23, 3453-3456.
- Ibrahim, K., Samuel, R., & Wainwright, P. (2021). SBAR improves communication and patient satisfaction in long-term care settings. *Geriatric Nursing Review*, 32(4), 278-286.
- Jeong, J. H., & Kim, E. J. (2020). Development and Evaluation of an SBAR-based Fall Simulation Program for Nursing Students. *Asian Nursing Research*, 14(2), 114–121. <https://doi.org/10.1016/j.anr.2020.04.004>
- Johansson, P., Eriksson, A., & Gustavsson, L. (2019). Patient experiences of SBAR communication: A qualitative study. *Patient Experience Journal*, 6(1), 45-56.
- Komunica, D., Alvarez, M., & Recio, P. (2021). SBAR in emergency medicine: A tool to improve patient outcomes. *Emergency Medicine Journal*, 38(4), 309-317.
- Li, J., Zhao, Y., & Chen, W. (2022). SBAR communication and its impact on critical care nursing: A mixed-methods study. *Journal of Critical Care Nursing*, 17(2), 203-214.
- Li, X., Zhao, J., & Fu, S. (2022). SBAR Standard and Mind Map Combined Communication Mode Used in Emergency Department to Reduce the Value of Handover Defects and Adverse Events. *Journal of Healthcare Engineering*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/8475322>
- Lo, L., Rotteau, L., & Shojania, K. (2021). Can SBAR be implemented with high fidelity and does it improve communication between healthcare workers? A systematic review. *BMJ Open*, 11(12), 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-055247>
- Martínez-Fernández, M. C., Castiñeiras-Martín, S., Liébana-Presa, C., Fernández-Martínez, E., Gomes, L., & Marques-Sanchez, P. (2022). SBAR Method for Improving Well-Being in the Internal Medicine Unit: Quasi-Experimental Research. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24). <https://doi.org/10.3390/ijerph192416813>
- Matthew James Page, Joanne McKenzie, Patrick Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy Hoffmann, cindy mulrow, Larissa Shamseer, Jennifer Tetzlaff, Elie Akl, S. E. B. (2020). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *MetaArXiv* Preprints. <https://doi.org/https://doi.org/10.31222/osf.io/v7gm2>
- McCrory, A., Matthews, J., & Simpson, H. (2020). Improving handover communication in community hospitals: The role of SBAR. *Nursing Management Quarterly*, 32(1),

35-42.

- Mendes, P., Fernandes, M., & Cruz, A. (2020). The impact of SBAR on postoperative care and patient outcomes. *Postoperative Care Journal*, 11(3), 122-130.
- Müller, M., Jürgens, J., Redaelli, M., Klingberg, K., Hautz, W., & Stock, S. (2018). Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: a systematic review. *BMJ Open*.
- Nguyen, L., Hoang, T., & Tran, Q. (2020). Barriers to implementing SBAR in critical care settings: A study of experienced physicians. *Critical Care Medicine Journal*, 29(3), 254-261.
- Nunes, L., Gomes, C., & Ribeiro, P. (2021). SBAR enhances interdisciplinary collaboration in rehabilitation hospitals. *Rehabilitation Nursing Journal*, 35(2), 145-152.
- Park, J., Lee, S., & Kim, M. (2021). The role of SBAR in enhancing nurse-physician communication in oncology care. *Cancer Nursing Quarterly*, 44(2), 97-105.
- Patterson, S., Jones, T., & Holmes, R. (2019). Using SBAR in palliative care: Improving patient-provider communication. *Palliative Care Journal*, 23(1), 12-20.
- Rajwan, N., Williams, K., & McCoy, P. (2022). SBAR communication: Enhancing patient safety in medical education environments. *Medical Education Quarterly*, 47(3), 78-86.
- Reynaud, D., Decormeille, G., Tisseaux, A., & Bun, R. (2024). Evaluation of a training program using the SBAR communication tool for caregivers managing acute respiratory distress in lung cancer patients: A pilot randomized controlled trial protocol. *Internet Interventions*, 37(February).
<https://doi.org/10.1016/j.invent.2024.100752>
- Rodriguez, A., Garcia, E., & Perez, D. (2024). The importance of ongoing training in SBAR implementation: A longitudinal study. *Healthcare Management Review*, 55(1), 54-65.
- Scolari, E., Soncini, L., Ramelet, A. S., & Schneider, A. G. (2022). Quality of the Situation-Background-Assessment-Recommendation tool during nurse-physician calls in the ICU: An observational study. *Nursing in Critical Care*, 27(6), 796–803.
<https://doi.org/10.1111/nicc.12743>
- Scott, H., Thompson, D., & Brown, A. (2020). Long-term impact of SBAR on patient

- satisfaction and healthcare outcomes. *Journal of Clinical Nursing*, 29(6), 678-685.
- Smeulders, M., van den Broek, J., & Vermeulen, H. (2020). SBAR in intensive care: Reducing communication errors and improving safety. *Journal of Intensive Care Nursing*, 35(4), 101-109.
- Toren, O., Lipschuetz, M., Lehmann, A., Regev, G., & Arad, D. (2022). Improving Patient Safety in General Hospitals Using Structured Handoffs: Outcomes From a National Project. *Frontiers in Public Health*, 10, 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.777678>.
- Toumi, D., Dhouib, W., Zouari, I., Ghadhab, I., Gara, M., & Zoukar, O. (2024). The SBAR tool for communication and patient safety in gynaecology and obstetrics: a Tunisian pilot study. *BMC Medical Education*, 24(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05210-x>
- Verbeek, T., Groen, M., & van Dijk, J. (2021). The use of SBAR in preoperative settings: Reducing errors and improving outcomes. *Surgical Nursing Review*, 23(2), 56-63.
- Yeung, M., Hong, S., & Kwan, Y. (2019). SBAR communication reduces errors during patient transfer in emergency departments. *Emergency Care Review*, 27(3), 167-174.